

INFORME DE MONITORATGE I CONTROL DE PLAGUES MALGRAT DE MAR

DATA: 29/04/2022

RESULTATS PER TIPUS D'ARBRE

PLANTA	OBSERVACIONS	TRACTAMENT O ACTUACIÓ A REALITZAR
ALZINES	Segueixen entre moderats i alts els nivells de pugó a les alzines. No es veu gaire melassa a les capçades ni als paviments degut a les neteges de les pluges recents. Hi ha sobretot parasitoids i algunes larves de marietes.	Monitoratge. Recomanem esperar que la fauna auxiliar controli de forma natural la plaga. Si mentrestant hi ha degoteig de melassa es pot fer una neteja amb aigua al paviment i/o aigua i sabó a les capçades. Si plou no cal fer les neteges.
CERCIS	Es manté un nivell moderat de psilla als cercis. Hi ha un cert degoteig de melassa. No s'observa fauna auxiliar.	En principi la plaga no ha de causar cap problema ja que els arbres no es troben en un lloc de pas. Monitoratge.
PERERES	Hi ha algunes colònies de pugó en els arbres més debilitats, sobretot alguns del C.R.Turró, que tenen la capçada força arrugada. Tot i així no veiem que els atacs causin molèsties. Hi ha una mica parasitisme.	Monitoratge. La fauna auxiliar sol controlar molt bé aquest pugó.
TIL·LERS	Van pujant poc a poc els nivells d' adults i de petites colònies de pugó en aquests arbres. No hi ha melassa ni degoteig. De moment no es veu fauna auxiliar encara.	Monitoratge.
XIPRERS	No observem pugó ni caparretes.	Monitoratge.
CATALPES	Hi veiem ja alguna colònia de pugó en algun brot. Poca cosa.	Monitoratge.
PLÀTANS	Hi ha un nivell baix d'adults de corythuca en algunes fulles. L'antracnosi dels brots sembla que s'ha aturat.	Monitoratge.
CEDRES/PINS	De moment no es detecta pugó ni caparreta als cedres o als pins.	Monitoratge.
PRUNERES	A les pruneres de la Pl. Pau Casals i del C.Escoles hi trobem algunes colònies de pugó. En algun arbre hi ha un lleuger degoteig de melassa. S'observen larves de sírfid.	Monitoratge.
ALBERS	Ja es veuen colònies de pugó en aquests arbres. No hi ha melassa ni fauna auxiliar, de moment.	Monitoratge.

OMS	Brotats però encara no s'hi veu galeruca.	Monitoratge.
ROURES	Es veu algun adult de pugó en l'arbre de la Pl. Pau Casals, no a la resta.	Monitoratge.
TAMARIUS	Els arbres de la Pl. dels Bombers Vol. Tenen nivells alts de pugó però també hi veiem ous de marietes.	Monitoratge.
TIPUANES	Res de moment	Monitoratge.
CHAMAEROPS	No es detecten atacs nous de Paysandisia.	Monitoratge.
MORERES	No detecto danys per Xylotrechus en cap dels arbres controlats.	Monitoratge.
GARROFERS	Algun dels garrofers del PSg. Bon Pastor tenen algunes branques seques, creiem que per l'acció de les rates.	Monitoratge

ESCOCELLS

En els escocells sembrats es mantenen florits les flors de St. Jordi (*Centranthus ruber*), els boixacs (*Calendula officinalis* i *C. arvensis*), la llengua de bou (*Echium vulgare*), la rosella (*Papaver rhoeas*), el blauet (*Centaurea cyanus*), el crepis capil·lar (*Crepis capillaris*), el cap blanc (*Lobularia marítima*), la trepadella (*Onobrichis viciifolia*), el violer groc (*Cheiranthus cheiri*), el crèpol (*Diplotaxis tenuifolia*), el trèvol (*Trifolium spp.*), el melilot (*Melilotus officinalis*), la camamilla (*Matricaria recutita*). Cada vegada ho están més la margarida groga (*Glebionis segetum*) el tordili (*Tordylium màximum*), el gavó (*Ononis natrix*), la milfulles (*Achillea millefolium*), el lli (*Linum usitatissimum*), el lotus (*Lotus corniculatus*), el tàrrec comú (*Salvia verbenaca*) i la vacària (*Vaccaria hispànica*).

Entre els que no s'han sembrats a prats i saulons hi ha florits les agulletes (*Erodium malacoides*), la dent de lleó (*Taraxacum officinale*) i algun trèvol.

En alguns escocells hi ha espècies que no s'han sembrat com malves (*Malva sylvestris*), ufals (*Medicago sativa*), rosella de Califòrnia (*Eschscholzia californica*), *Phacelia tanacetifolia*, borrajia (*Borago officinalis*), gramínies, apegalosa (*Galium aparine*), fonoll (*Foeniculum vulgare*).

Hi ha espècies que ja han deixat de florir, com els albons (*Asphodelus sp.*) i el silene (*Silene colorata*). D'altres encara no han florit o just ara comencen, com els conillets (*Anthirrinum majus*), el gratabous (*Centaurea scabiosa*), la pastanaga borda (*Daucus carota*), la siscla (*Amni majus*) l'hipèric tomentós (*Hypericum tomentosum*) o la vídua borda (*Knautia arvensis*).

Aquesta setmana trobem encara pugó a la flor de St. Jordi, el blauet, la margarida groga, la camamilla, l'apegalosa, la rosella, l'ufals, el fonoll, la pastanaga borda. També hi ha ja més fauna auxiliar als escocells, sobretot parasitoids, marieta adulta (*Coccinella 7p*), adults i alguna larva de sírfid, ous de crisopes,...

FOTOS



Colònia de pugó en un àlber



Ous de marieta i colònia de pugó en un tamarisc



Colònia de pugó en una perera



Larva de sírfid i pugó en una prunera

Propera visita: dia 7 de maig